

Bijlage

Van ICD-9-CM-codes naar ICD-10-CM-codes

De stoornissen staan in de volgorde waarin ze in de tekst voorkomen.* De eerste code is steeds de ICD-9-CM-code, dan volgt een rechte streep (|) en dan de ICD-10-CM-code.

STOORNISSEN DIE MEESTAL VOOR HET EERST
IN DE KINDERTIJD OF ADOLESCENTIE WORDEN
GEDIAGNOSTICEERD (*zie hoofdstuk 2*)

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

314.01 F90.1	Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend hyperactief-impulsief type
314.00 F90.0	Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidstype
314.01 F90.2	Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, gecombineerde type
314.9 F90.9	Niet-gespecificeerde aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

Gedragstoornis en oppositioneel-opstandige gedragstoornis

312.81 F91.1	Gedragstoornis, type beginnende in de kindertijd
312.82 F91.2	Gedragstoornis, type beginnende in de adolescentie

* Uit: Allen Frances, *Psychiatrische diagnostiek – de essentie* (© 2014, Uitgeverij Nieuwezijds).

312.89	F91.9	Gedragstoornis, type niet-gespecificeerd begin
313.81	F91.3	Oppositieel-opstandige gedragsstoornis
312.9	F90.9	Niet-gespecificeerde gedragsstoornis

299.00 | F84.0 Autismespectrumstoornis

309.21 | F93.0 Separatie-angststoornis

Intellectuele ontwikkelingsstoornis

317	F70	Licht
318.0	F71	Matig
318.1	F72	Ernstig
318.2	F73	Zeer ernstig

Specifieke leerstoornis

315.00	F81.0	Lezen
315.1	F81.2	Rekenen
314.2	F81.81	Schriftelijke uitdrukingsvaardigheid
315.9	F81.9	Niet-gespecificeerd

Voedingsstoornissen

307.52	F98.3	Pica (bij kinderen)
307.53	F98.21	Ruminatiestoornis

Zindelijkheidsstoornissen

307.7	F98.1	Encopresis
307.6	F98.0	Enuresis

DEPRESSIEVE STOORNISSEN (zie hoofdstuk 3)

Depressieve stoornis

Indien eenmalige episode:

296.21	F32.0	Depressieve stoornis, eenmalige episode, licht
296.22	F32.1	Depressieve stoornis, eenmalige episode, matig
296.23	F32.2	Depressieve stoornis, eenmalige episode, ernstig zonder psychotische kenmerken

296.24 F32.3	Depressieve stoornis, eenmalige episode, ernstig met psychotische kenmerken
296.20 F32.9	Depressieve stoornis, eenmalige episode, niet-gespecificeerd

Indien recidiverend:

296.31 F33.0	Depressieve stoornis, recidiverend, licht
296.32 F33.1	Depressieve stoornis, recidiverend, matig
296.33 F33.2	Depressieve stoornis, recidiverend, ernstig zonder psychotische kenmerken
296.34 F33.3	Depressieve stoornis, recidiverend, ernstig met psychotische kenmerken
296.30 F33.9	Depressieve stoornis, recidiverend, niet-gespecificeerd

300.4 | F34.1 Chronische depressieve stoornis (dysthymie)**625.4 | N94.3 Premenstruele dysforische stoornis****Depressieve stoornis door een middel**

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor depressieve stoornis door een middel 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor depressieve stoornis door een middel 'met milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 25).

291.89 F10.24	Door alcohol geïnduceerd
292.84 F15.24	Door amfetamine geïnduceerd
292.84 F14.24	Door cocaïne geïnduceerd
292.84 F16.24	Door hallucinogeen geïnduceerd
292.84 F18.24	Door vluchtige stof geïnduceerd
292.84 F11.24	Door opioïde geïnduceerd
292.84 F16.24	Door fencyclidine geïnduceerd
292.84 F13.24	Door sedativum-, hypnoticum- of anxiolyticum geïnduceerd
292.84 F19.24	Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

Depressieve stoornis door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)

293.83 | F06.31 Met depressieve kenmerken

293.83 | F06.32 Met episode die lijkt op een depressieve stoornis

293.83 | F06.34 Met gemengde kenmerken

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

311 | F32.9 Niet-gespecificeerde depressieve stoornis

296.90 | F39 Niet-gespecificeerde stemmingsstoornis

BIPOLAIRE STOORNISSEN (zie hoofdstuk 4)

Bipolaire I-stoornis

296.01 | F30.11 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, licht

296.02 | F30.12 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, matig

296.03 | F30.13 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, ernstig

296.04 | F30.2 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, ernstig met psychotische kenmerken

296.05 | F30.3 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, gedeeltelijk in remissie

296.06 | F30.4 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, volledig in remissie

296.00 | F30.10 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, niet-gespecificeerd

296.40 | F31.0 Bipolaire I-stoornis, laatste episode hypomaan

296.41 | F31.11 Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, licht

296.42 | F31.12 Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, matig

296.43 | F31.13 Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, ernstig

296.44 | F31.2 Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, ernstig met psychotische kenmerken

296.45 | F31.73 Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, gedeeltelijk in remissie

296.46 F31.74	Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, volledig in remissie
296.40 F31.10	Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, niet-gespecificeerd
296.51 F31.31	Bipolaire I-stoornis, laatste episode depressief, licht
296.52 F31.32	Bipolaire I-stoornis, laatste episode depressief, matig
296.53 F31.4	Bipolaire I-stoornis, laatste episode depressief, ernstig
296.54 F31.5	Bipolaire I-stoornis, laatste episode depressief, ernstig met psychotische kenmerken
296.55 F31.75	Bipolaire I-stoornis, laatste episode depressief, gedeeltelijk in remissie
296.56 F31.76	Bipolaire I-stoornis, laatste episode depressief, volledig in remissie
296.50 F31.30	Bipolaire I-stoornis, laatste episode depressief, niet-gespecificeerd
296.61 F30.61	Bipolaire I-stoornis, laatste episode gemengd, licht
296.62 F30.62	Bipolaire I-stoornis, laatste episode gemengd, matig
296.63 F30.63	Bipolaire I-stoornis, laatste episode gemengd, ernstig
296.64 F30.64	Bipolaire I-stoornis, laatste episode gemengd, ernstig met psychotische kenmerken
296.65 F30.77	Bipolaire I-stoornis, laatste episode gemengd, gedeeltelijk in remissie
296.66 F30.78	Bipolaire I-stoornis, laatste episode gemengd, volledig in remissie
296.60 F30.60	Bipolaire I-stoornis, laatste episode gemengd, niet-gespecificeerd
296.7 F31.9	Bipolaire I-stoornis, laatste episode niet-gespecificeerd
296.89 F31.81	Bipolaire II-stoornis
301.13 F34.0	Cyclothyme stoornis

Bipolaire stoornis door een middel

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor bipolaire stoornis door een mid-

del 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor bipolaire stoornis door een middel 'met milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 25).

291.89 F10.24	Door alcohol geïnduceerd
292.84 F15.24	Door amfetamine geïnduceerd
292.84 F14.24	Door cocaïne geïnduceerd
292.84 F16.24	Door hallucinogeen geïnduceerd
292.84 F11.24	Door opioïde geïnduceerd
292.84 F16.24	Door fencyclidine geïnduceerd
292.84 F13.24	Door sedativum-, hypnoticum- of anxiolyticum geïnduceerd
292.84 F19.24	Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

Bipolaire stoornis door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)

293.83 F06.33	Met manische kenmerken
293.83 F06.33	Met episodes die lijken op manische of hypomane episodes
293.83 F06.34	Met gemengde kenmerken

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

296.80 | F31.9 Niet-gespecificeerde bipolaire stoornis

296.90 | F39 Niet-gespecificeerde stemmingsstoornis

ANGSTSTOORNISSEN (zie hoofdstuk 5)

Paniekstoornis

300.21 F40.01	Paniekstoornis met agorafobie
300.01 F41.0	Paniekstoornis zonder agorafobie

300.22 | F40.0 Agorafobie

300.23 | F40.10 Sociale angststoornis (sociale fobie)

Specifieke fobie

300.29 F40.218	Dieren
300.29 F40.230	Bloed-injectie-verwonding, Angst voor bloed
300.29 F40.231	Bloed-injectie-verwonding, Angst voor injecties en bloedtransfusies
300.29 F40.233	Bloed-injectie-verwonding, Angst voor verwonding
300.29 F40.232	Bloed-injectie-verwonding, Angst voor overige medische zorg
300.29 F40.228	Natuurlijke omgeving
300.29 F40.248	Bepaalde situaties
300.29 F40.298	Overige

300.02 | F41.1 Gegeneraliseerde angststoornis**Angststoornis door een middel**

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor angststoornis door een middel ‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor angststoornis door een middel ‘met milde stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het gebruik’ zie Over de ICD-codering (p. 25).

291.89 F10.280	Door alcohol geïnduceerd
292.89 F15.280	Door amfetamine geïnduceerd
292.89 F15.280	Door cafeïne geïnduceerd
292.89 F12.280	Door cannabis geïnduceerd
292.89 F14.280	Door cocaïne geïnduceerd
292.89 F16.280	Door hallucinogeen geïnduceerd
292.89 F18.280	Door vluchtige stof geïnduceerd
292.89 F11.288	Door opioïde geïnduceerd
292.89 F16.280	Door fencyclidine geïnduceerd
292.89 F13.280	Door sedativum-, hypnoticum- of anxiolyticum geïnduceerd
292.89 F19.280	Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

293.84 | F06.4 Angststoornis door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

300.00 | F41.9 Niet-gespecificeerde angststoornis

OBSESSIEVE-COMPULSIEVE EN GERELATEERDE STOORNISSEN
(zie hoofdstuk 6)

300.3 | F42 Obsessieve-compulsieve stoornis**300.7 | F45.22 Stoornis in de lichaamsbeleving****300.3 | F42 Verzameldwang (hoarding disorder)****Ticstoornissen**

- 307.23 | F95.2 Stoornis van Gilles de la Tourette
- 307.22 | F95.1 Chronische motorische of vocale ticstoornis
- 307.21 | F95.0 Tijdelijke ticstoornis
- 333.3 | G25.61 Ticstoornis door een middel (vermeld het middel)
- 333.3 | G25.69 Ticstoornis door een andere somatische aandoening
(vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

307.20 | F95.9 Niet-gespecificeerde ticstoornis**312.39 | F63.3 Trichotillomanie****Obsessieve-compulsieve stoornis of een gerelateerde stoornis door een middel**

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor obsessieve-compulsieve stoornis door een middel 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor obsessieve-compulsieve stoornis door een middel 'met milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 25).

- 292.89 | F15.288 Door amfetamine geïnduceerd
- 292.89 | F14.288 Door cocaïne geïnduceerd
- 292.89 | F19.288 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

294.8 | F06.8 Obsessieve-compulsieve stoornis of een gerelateerde stoornis door een somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

300.00 | F42 Niet-gespecificeerde obsessieve-compulsieve stoornis of gerelateerde stoornis

TRAUMA- EN STRESSGERELATEERDE STOORNISSEN (zie hoofdstuk 7)

309.81 | F43.10 Posttraumatische stress-stoornis

308.3 | F43.0 Acute stress-stoornis

Aanpassingsstoornis

309.0 | F43.21 Aanpassingsstoornis met depressieve stemming

309.24 | F43.22 Aanpassingsstoornis met angst

309.28 | F43.23 Aanpassingsstoornis met gemengd angstige en depressieve stemming

309.3 | F43.24 Aanpassingsstoornis met verstoring van het gedrag

309.4 | F43.25 Aanpassingsstoornis met gemengde verstoring van emoties en gedrag

309.9 | F43.20 Niet-gespecificeerde aanpassingsstoornis

309.89 | F43.8 Niet-gespecificeerde trauma- en stressgerelateerde stoornis

SCHIZOFRENIESPECTRUM EN ANDERE PSYCHOTISCHE STOORNISSEN (zie hoofdstuk 8)

295.9 | F20.9 Schizofrenie

295.40 | F20.81 Schizofreniforme stoornis

Schizoaffectieve stoornis

- 295.70 | F25.0 Bipolaire type
 295.70 | F25.1 Depressieve type

297.1 | F22 Waanstoornis**297.3 | F24 Gedeelde psychotische stoornis (folie à deux)****298.8 | F23 Kortdurende psychotische stoornis****Psychotische stoornis door een middel**

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor psychotische stoornis door een middel 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor psychotische stoornis door een middel 'met milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 25).

- 291.9 | F10.259 Door alcohol geïnduceerd
 292.9 | F15.259 Door amfetamine geïnduceerd
 292.9 | F12.259 Door cannabis geïnduceerd
 292.9 | F14.259 Door cocaïne geïnduceerd
 292.9 | F16.259 Door hallucinogeen geïnduceerd
 292.9 | F18.259 Door vluchtige stof geïnduceerd
 292.9 | F11.259 Door opioïde geïnduceerd
 292.9 | F16.259 Door fencyclidine geïnduceerd
 292.9 | F13.259 Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum geïnduceerd
 292.9 | F19.259 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

Psychotische stoornis door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)

- 293.81 | F06.2 Met wanen
 293.82 | F06.0 Met hallucinaties

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

293.89 | F06.1 Katatone stoornis door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

298.9 | F29 Niet-gespecificeerde psychotische stoornis

AAN MIDDELEN GEBONDEN STOORNISSEN (zie hoofdstuk 9)

Afhankelijkheid van een middel

303.90 F10.20	Alcoholafhankelijkheid
304.40 F15.20	Amfetamineafhankelijkheid
304.30 F12.20	Cannabisafhankelijkheid
304.20 F14.20	Cocaïneafhankelijkheid
304.30 F16.20	Hallucinogeenafhankelijkheid
304.60 F18.20	Afhankelijkheid van vluchtige stof
304.00 F11.20	Afhankelijkheid van opioïde
304.60 F16.20	Afhankelijkheid van fencyclidine
304.10 F13.20	Afhankelijkheid van sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
305.1 F17.200	Afhankelijkheid van tabak
304.80 F19.20	Afhankelijkheid van verschillende middelen
304.90 F19.20	Afhankelijkheid van ander (of onbekend) middel (vermeld zo mogelijk het middel)

Misbruik van een middel

305.00 F10.10	Misbruik van alcohol
305.70 F15.10	Misbruik van amfetamine
305.20 F12.10	Misbruik van cannabis
305.60 F14.10	Misbruik van cocaïne
305.30 F16.10	Misbruik van hallucinogenen
305.90 F18.10	Misbruik van vluchtige stof
305.50 F11.10	Misbruik van opioïden
305.90 F16.10	Misbruik van fencyclidine
305.40 F13.10	Misbruik van een sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
305.90 F19.10	Misbruik van een ander (of onbekend) middel (vermeld zo mogelijk het middel)

Intoxicatie door een middel

Met uitzondering van intoxicatie door cafeïne zijn de onderstaande ICD-10-CM-codes voor intoxicatie door een middel 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor intoxicatie door een middel 'met milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 25).

303.00	F10.229	Alcoholintoxicatie
292.89	F15.229	Amfetamine-intoxicatie
305.90	F15.929	Caffeïne-intoxicatie
292.89	F12.229	Cannabis-intoxicatie, zonder perceptuele vervormingen
292.89	F12.222	Cannabis-intoxicatie, met perceptuele vervormingen
292.89	F14.229	Cocaïne-intoxicatie
292.89	F16.229	Hallucinogeen-intoxicatie
292.89	F18.229	Vluchtige stof-intoxicatie
292.89	F11.229	Opioïde-intoxicatie
292.89	F16.229	Fencyclidine-intoxicatie
292.89	F13.229	Sedativum-, hypnoticum- of anxiolyticum-intoxicatie
292.89	F19.229	Intoxicatie door een ander (of onbekend) middel (vermeld zo mogelijk het middel)

Onthouding van een middel

Met uitzondering van onthouding van cafeïne zijn de onderstaande ICD-10-CM-codes voor onthouding van een middel 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid), omdat onthouding van een middel 'met milde stoornis in het gebruik' of 'zonder stoornis in het gebruik' niet kan worden gecodeerd.

291.81	F10.239	Onthouding van alcohol, zonder perceptuele vervormingen
291.81	F10.232	Onthouding van alcohol, met perceptuele vervormingen
292.0	F15.23	Onthouding van amfetamine
292.0	F15.93	Onthouding van cafeïne
292.0	F12.288	Onthouding van cannabis
292.0	F14.23	Onthouding van cocaïne
292.0	F11.23	Onthouding van opioïde
292.0	F13.239	Onthouding van sedativum, hypnoticum of anxiolyticum, zonder perceptuele vervormingen

- 292.0 | F13.232 Onthouding van sedativum, hypnoticum of
anxiolyticum, met perceptuele vervormingen
- 292.0 | F17.203 Onthouding van tabak
- 292.0 | F19.239 Onthouding van een ander (of onbekend) middel

Psychische stoornissen door een middel

Hieronder volgen uitsluitend de psychische stoornissen door een middel die in deze bijlage niet onder de andere categorieën stoornissen worden genoemd (depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen, enzovoort).

- 291.9 | F10.99 Niet-gespecificeerde aan alcohol gerelateerde stoornis
- 292.9 | F15.99 Niet-gespecificeerde aan amfetamine gerelateerde
stoornis
- 292.9 | F15.99 Niet-gespecificeerde aan cafeïne gerelateerde stoornis
- 292.9 | F12.99 Niet-gespecificeerde aan cannabis gerelateerde stoornis
- 292.9 | F14.99 Niet-gespecificeerde aan cocaïne gerelateerde stoornis
- 292.9 | F16.99 Niet-gespecificeerde aan hallucinogeen gerelateerde
stoornis
- 292.9 | F18.99 Niet-gespecificeerde aan vluchtige stof gerelateerde
stoornis
- 292.9 | F11.99 Niet-gespecificeerde aan opioïde gerelateerde stoornis
- 292.9 | F16.99 Niet-gespecificeerde aan fencyclidine gerelateerde
stoornis
- 292.9 | F13.99 Niet-gespecificeerde aan sedativum, hypnoticum of
anxiolyticum gerelateerde stoornis
- 292.9 | F17.209 Niet-gespecificeerde aan tabak gerelateerde stoornis
- 292.9 | F19.99 Niet-gespecificeerde aan ander (of onbekend) middel
gerelateerde stoornis

NEUROCOGNITIEVE STOORNISSEN (zie hoofdstuk 10)

Delirium

- 293.0 | F05 Delirium door een andere somatische aandoening
(vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

Door middel geïnduceerd delirium

Tenzij anders aangegeven, dienen de onderstaande ICD-10-CM-codes te worden gebruikt gedurende de intoxicatie en 'bij matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor door een middel geïnduceerd delirium gedurende de intoxicatie 'bij milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 25).

291.0	F10.221	Door alcohol geïnduceerd tijdens intoxicatie
291.0	F10.231	Door alcohol geïnduceerd tijdens onthouding
292.81	F15.221	Door amfetamine geïnduceerd
292.81	F12.221	Door cannabis geïnduceerd
292.81	F14.221	Door cocaïne geïnduceerd
292.81	F16.221	Door hallucinogeen geïnduceerd
292.81	F18.221	Door vluchtige stof geïnduceerd
292.81	F11.221	Door opioïde geïnduceerd tijdens intoxicatie
292.0	F11.23	Door opioïde geïnduceerd tijdens onthouding
292.81	F16.921	Door fencyclidine geïnduceerd
292.81	F13.221	Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum geïnduceerd tijdens intoxicatie
292.81	F13.231	Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum geïnduceerd tijdens onthouding
292.81	F19.221	Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd tijdens intoxicatie
292.81	F19.231	Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd tijdens onthouding
780.09	R41.0	Niet-gespecificeerd delirium

Primaire neurocognitieve stoornis (dementie)

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn de codes voor 'waarschijnlijke' (vs. 'mogelijke') dementie. En met uitzondering van persisterende dementie door een middel moet ook de bijbehorende code van de medische aandoening gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

Dementie door de ziekte van Alzheimer

294.11	F02.81	Met gedragsstoornissen
294.10	F02.80	Zonder gedragsstoornissen

Vasculaire dementie

290.40 F01.51	Met gedragsstoornissen
290.40 F01.50	Zonder gedragsstoornissen

Dementie door traumatisch hersenletsel

294.11 F02.81	Met gedragsstoornissen
294.10 F02.80	Zonder gedragsstoornissen

Dementie door de ziekte van Parkinson

294.11 F02.81	Met gedragsstoornissen
294.10 F02.80	Zonder gedragsstoornissen

Lewy body-dementie

294.11 F02.81	Met gedragsstoornissen
294.10 F02.80	Zonder gedragsstoornissen

Dementie door hiv-infectie

294.11 F02.81	Met gedragsstoornissen
294.10 F02.80	Zonder gedragsstoornissen

Dementie door frontotemporale kwab degeneratie

294.11 F02.81	Met gedragsstoornissen
294.10 F02.80	Zonder gedragsstoornissen

Dementie door de ziekte van Huntington

294.11 F02.81	Met gedragsstoornissen
294.10 F02.80	Zonder gedragsstoornissen

Dementie door prionziekte

294.11 F02.81	Met gedragsstoornissen
294.10 F02.80	Zonder gedragsstoornissen

Persisterende dementie door een middel

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor persisterende dementie door een middel 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor persisterende dementie door een middel

‘met milde stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het gebruik’ zie Over de ICD-codering (p. 25).

- | | | |
|--------|--------|---|
| 291.2 | F10.27 | Door alcohol geïnduceerd, non-amnestische confabulerende type |
| 291.2 | F10.26 | Door alcohol geïnduceerd, amnestische confabulerende type |
| 292.82 | F13.27 | Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum geïnduceerd |
| 292.82 | F18.27 | Door vluchtige stof geïnduceerd |
| 292.82 | F19.27 | Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd |

Milde neurocognitieve stoornis

De codes voor de diagnose milde neurocognitieve stoornis zijn hier niet opgenomen omdat ik het gebruik van deze DSM-5-categorie afraad. Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 10.

294.8 | R41.9 Niet-gespecificeerde neurocognitieve stoornis

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN (zie hoofdstuk 11)

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| 301.83 | F60.3 | Borderline persoonlijkheidsstoornis |
| 301.7 | F60.2 | Antisociale persoonlijkheidsstoornis |
| 301.81 | F60.81 | Narcistische persoonlijkheidsstoornis |
| 301.50 | F60.4 | Theatrale persoonlijkheidsstoornis |
| 301.4 | F60.5 | Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis |
| 301.82 | F60.6 | Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis |
| 301.6 | F60.7 | Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis |
| 301.0 | F60.0 | Paranoïde persoonlijkheidsstoornis |
| 301.20 | F60.1 | Schizoïde persoonlijkheidsstoornis |

301.22 | F21 Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

310.1 | F07.0 Persoonlijkheidsverandering door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

301.9 | F60.9 Niet-gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

STOORNISSEN IN DE IMPULSBEHEERSING (*zie hoofdstuk 12*)

312.31 | F63.0 Pathologisch gokken

312.34 | F63.81 Periodieke explosieve stoornis

312.33 | F63.1 Pyromanie

312.32 | F63.2 Kleptomanie

312.30 | F63.9 Niet-gespecificeerde stoornis in de impulsbeheersing

EETSTOORNISSEN (*zie hoofdstuk 13*)

307.1 | F50.00 Anorexia nervosa

307.51 | F50.2 Bulimia nervosa

307.51 | F50.8 Eetbuistoornis

Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 13.

307.50 | F50.9 Niet-gespecificeerde eetstoornis

SLAAP-WAAKSTOORNISSEN (*zie hoofdstuk 14*)

780.52 | G47.00 Insomniastoonis

De bijbehorende code van elke psychische stoornis of medische aandoening die in dit verband relevant is, moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

Slaap-waakstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek

307.45 G47.21	Uitgestelde-slaapfasetype
307.45 G47.22	Slaapfasevervroegingstype
307.45 G47.23	Onregelmatig-slaap-waakritmetype
307.45 G47.24	Niet-24-uurs-slaap-waakritmetype
307.45 G47.26	Ploegendiensttype
307.45 G47.20	Niet-gespecificeerd type

780.54 | G47.10 Hypersomnolentiestoornis

De bijbehorende code van elke psychische stoornis of medische aandoening die in dit verband relevant is, moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

780.57 | G47.30 Niet-gespecificeerde slaapapneu

Zoals is opgemerkt in hoofdstuk 14, beschouw ik slaapapneu niet als een psychische stoornis. Voor de codes van andere soorten slaapapneu, zie Over de ICD-codering (p. 25).

Non-rapid eye movement-slaapgedragstoornis

307.46 F51.3	Slaapwandeltype
307.46 F51.4	Pavor nocturnus-type

307.47 | F51.5 Nachtmerries

327.42 | G47.52 Rapid eye movement-slaapgedragstoornis

Slaap-waakstoornis door een middel

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor slaap-waakstoornis door een middel 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor slaap-waakstoornis door een middel 'met milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 25).

291.82 F10.282	Door alcohol geïnduceerd
------------------	--------------------------

292.85 F15.282	Door amfetamine geïnduceerd
292.85 F15.282	Door cafeïne geïnduceerd
292.85 F12.288	Door cannabis geïnduceerd
292.85 F14.282	Door cocaïne geïnduceerd
292.85 F11.282	Door opioïde geïnduceerd
292.85 F13.282	Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum geïnduceerd
292.85 F17.208	Door tabak geïnduceerd
292.85 F19.282	Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

327.01 | G47.01 Insomnia door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

327.14 | G47.14 Hypersomnia door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

780.52 | G47.00 Niet-gespecificeerde insomnia

780.54 | G47.10 Niet-gespecificeerde hypersomnia

780.59 | G47.9 Niet-gespecificeerde slaap-waakstoornis

SEKSUELE EN GENDERPROBLEMEN (zie hoofdstuk 15)

Genderdysforie

302.T6 F64.2	Genderdysforie bij kinderen
302.85 F64.1	Genderdysforie bij adolescenten of volwassenen

Seksuele disfuncties

302.71 F52.0	Seksuele stoornis met verminderd verlangen bij de man
302.72 F52.21	Erectiestoornis
302.75 F52.4	Vroegtijdige ejaculatie
302.74 F52.32	Vertraagde ejaculatie

302.72 F52.22	Seksuele stoornis met verminderd verlangen/seksuele opwindingsstoornis bij de vrouw
302.73 F52.31	Orgasmestooris bij de vrouw
302.76 F52.6	Genitale-bekkenpijn/penetratiestoornis

Seksuele disfunctie door een middel

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor seksuele disfunctie door een middel 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor seksuele disfunctie door een middel 'met milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 25).

291.89 F10.281	Door alcohol geïnduceerd
292.89 F15.281	Door amfetamine geïnduceerd
292.89 F14.281	Door cocaïne geïnduceerd
292.89 F11.281	Door opioïde geïnduceerd
292.89 F13.281	Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum geïnduceerd
292.89 F19.281	Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

Seksuele disfunctie door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 25).

608.89 N50.8	Seksuele stoornis door een andere somatische aandoening met verminderd verlangen bij de man
607.84 N52.9	Erectiestoornis door een andere somatische aandoening
625.8 N94.89	Seksuele stoornis met verminderd verlangen/seksuele opwindingsstoornis door een andere somatische aandoening bij de vrouw
625.0 N94.1	Genitale-bekkenpijn/penetratiestoornis door een andere somatische aandoening
302.70 F52.9	Niet-gespecificeerde seksuele disfunctie

Parafiele stoornissen

302.2 F65.4	Pedofiele stoornis
302.4 F65.2	Exhibitionistische stoornis
302.82 F65.3	Voyeuristische stoornis

302.89	F65.81	Frotteuristische stoornis
302.84	F65.52	Seksueel sadisme stoornis
302.83	F65.51	Seksueel masochisme stoornis
302.81	F65.0	Fetisjistische stoornis
302.3	F65.1	Transvestitistische stoornis
302.9	F65.9	Niet-gespecificeerde parafiele stoornis

STOORNISSEN GERELATEERD AAN LICHAMELIJKE SYMPTOMEN (*zie hoofdstuk 16*)

300.82 | F45.1 Somatische symptoomstoornis

Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 16.

Conversiestoornis (functionele neurologische symptoomstoornis)

300.11	F44.4	Conversiestoornis met motorische symptomen
300.11	F44.6	Conversiestoornis met sensorische symptomen
300.11	F44.5	Conversiestoornis met convulsies
300.11	F44.7	Conversiestoornis met gemengde symptomen

316 | F54 Psychische factoren die de somatische aandoening beïnvloeden

300.19 | F68.10 Nagebootste stoornis

DISSOCIATIEVE STOORNISSEN (*zie hoofdstuk 17*)

300.14 | F44.81 Dissociatieve identiteitsstoornis (meervoudige persoonlijkheidsstoornis)

Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 17.

300.12 | F44.0 Dissociatieve amnesie

Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 17.

300.6 | F48.1 Depersonalisatiestoornis/derealisatiestoornis

300.15 | F44.9 Niet-gespecificeerde dissociatieve stoornis

CODES VOOR AANDOENINGEN DIE EEN REDEN VOOR ZORG KUNNEN ZIJN, MAAR GEEN PSYCHISCHE STOORNIS ZIJN (zie hoofdstuk 18)

Relatieproblemen

- v61.20 | z62.820 Ouder-kindrelatieprobleem
- v61.10 | z63.0 Partnerrelatieprobleem
- v61.8 | z62.891 Relatieprobleem tussen de kinderen
- v62.81 | z63.9 Niet-gespecificeerd relatieprobleem

Problemen in verband met misbruik of verwaarlozing

Hieronder volgt een soort samenvatting van de zeer complexe ICD-10-CM-codes. Voor aanvullende codes zie Over de ICD-codering (p. 25).

- v61.21 | z69.010 Lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing van kind (focus van de behandeling op slachtoffer, misbruik door ouder)
- v61.21 | z69.020 Lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing van kind (focus van de behandeling op slachtoffer, misbruik door niet-ouder)
- v61.22 | z69.011 Lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing van kind (focus van de behandeling op ouder)
- v62.83 | z69.021 Lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing van kind (focus van de behandeling op niet-ouder)
- 995.54 | T74.12X Lichamelijke mishandeling van kind (focus op bevestigd delict)
- 995.54 | T76.12X Lichamelijke mishandeling van kind (focus op vermoed delict)
- 995.53 | T74.22X Seksueel misbruik van kind (focus op bevestigd delict)
- 995.53 | T76.22X Seksueel misbruik van kind (focus op vermoed delict)
- 995.52 | T74.02X Verwaarlozing van kind (focus op bevestigd delict)
- 995.52 | T76.02X Verwaarlozing van kind (focus op vermoed delict)

- v61.11 | z69.11 Fysiek misbruik of seksueel misbruik van echtgenoot/partner (focus op behandeling slachtoffer)

v61.12 z69.12	Fysiek misbruik of seksueel misbruik van echtgenoot/partner (focus op behandeling dader)
v65.49 z69.81	Fysiek misbruik of seksueel misbruik van volwassen niet-partner (focus op behandeling slachtoffer)
v62.83 z69.82	Fysiek misbruik of seksueel misbruik van volwassen niet-partner (focus op behandeling dader)
995.81 T74.11X	Fysiek misbruik van volwassene (focus op bevestigd delict)
995.81 T76.11X	Fysiek misbruik van volwassene (focus op vermoed delict)
995.83 T74.21X	Seksueel misbruik van volwassene (focus op bevestigd delict)
995.83 T76.21X	Seksueel misbruik van volwassene (focus op vermoed delict)

Bewegingsstoornissen door een geneesmiddel teweegebracht

332.1 G21.11	Neuroleptisch parkinsonisme
332.1 G21.19	Parkinsonisme door overige geneesmiddelen teweegebracht
333.92 G21.0	Maligne neuroleptisch syndroom
333.72 G24.02	Acute dystonie door geneesmiddelen teweegebracht
333.99 G25.71	Acute acathisie door geneesmiddelen teweegebracht
333.85 G24.01	Tardieve dyskinesie
333.72 G24.09	Tardieve dystonie
333.99 G25.71	Tardieve acathisie
333.1 G25.1	Houdingstremor door geneesmiddelen teweegebracht
333.90 G25.9	Niet-gespecificeerde bewegingsstoornis door geneesmiddelen teweegebracht

Andere problemen

v15.81 z91.19	Niet meewerken aan behandeling
v65.2 z76.5	Simulatie
v71.01 z72.811	Antisociaal gedrag bij volwassenen
v71.02 z72.810	Antisociaal gedrag bij een kind of adolescent
v62.89 R41.83	Zwakbegaafdheid
780.97 R41.82	Met de leeftijd samenhangende cognitieve achteruitgang
v62.82 z63.4	Rouwreactie

v62.3 z55.9	Studieprobleem
v62.2 z56.9	Beroepsprobleem
v62.89 z65.8	Religieus of spiritueel probleem
v62.4 z60.3	Acculturatieprobleem
v62.89 z60.0	Levensfaseprobleem
995.29 T43.205	Onthouding van antidepressiva
995.20 T50.905	Overige bijwerkingen van geneesmiddelen

Over de ICD-codering

De overstap van ICD-9-CM naar ICD-10-CM als coderingssysteem heeft het aantal en de complexiteit van de diagnostische codes enorm doen toenemen. Omwille van de gebruiksvriendelijkheid voor clinici zijn in *Psychiatrische diagnostiek – de essentie* niet alle ICD-10-CM-codes voor alle beschreven stoornissen opgenomen in de hoofdtekst en de bijlage Van ICD-9-CM-codes naar ICD-10-CM-codes. De vertaling van het ene naar het andere coderingssysteem is bovendien noodzakelijkerwijs niet altijd exact, soms is er sprake van uiteenlopende interpretaties. De verschillende conversie-websites en de door de DSM-5 voorgestelde omzetting van het ene naar het andere systeem laten dan ook hier en daar verschillen zien – geen enkele bron kan daarbij aanspraak maken op absolute autoriteit. De DSM-5 kwam al direct na de eerste oplage met correcties in de coderingen. Ik heb bij de omzetting van het ene naar het andere systeem steeds gekozen voor wat in mijn ogen de beste en meest praktische optie is, maar wie het hele spectrum aan keuzemogelijkheden wil verkennen vindt hieronder een aantal websites.

www.icd10data.com

www.icd10codesearch.com

<http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en>

www.aapc.com/icd-10/index.aspx

www.guilford.com/frances_updates

www.dsm5.org